

Пољопривредна стручна служба „Сомбор“ д.о.о.

телефон: +38125 5412488; +38125 5414351

факс: +38125 5422855

e-mail: agroso@open.telekom.rs

web site: www.psssombor.rs

25000 Сомбор, Стапарски пут 35



SAOPŠTENJE PSS"СОМБОР" СОМБОР

Na području delovanja RC Sombor, kajsija se nalazi u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 59-65 -prvi cvetovi otvoreni, početak cvetanja do puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice otpadaju). Ovo je fenofaza kada je ova voćna vrsta osetljiva na prouzrokovala sušenja cvetova i grančica (*Monilia laxa*).

Preporučujemo proizvođačima da urade tretman fungicidima

-Dional (a.m. iprodion) 1,5 l/ha

-Octave (a.m. prochloraz) u koncentraciji od 0,04%

Pregledom zasada breskve i nektarine, konstatovano je da se zasadi nalaze u fazi 63-64 BBCH skale (oko 30-40% cvetova je otvoreno). Potrebno je da proizvođači primene fungicide za zaštitu zasada od *Monilia laxa* – prouzrokovala sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (proizvođači koji su obavili prvi tretman, sada treba da obave i drugi).

Primeniti neke od fungicida:

a.m. prochloraz (Octave) u koncentraciji od 0,04%

a.m. iprodion (Dional) u koncentraciji od 0,15%

a.m. boskalid + piraklostrobin (Signum) u dozi od 0,562-0,75 kg/ha

a.m. ciprodinil (Ciprodex) u koncentraciji od 0,05%

Radi zaštite pčela tretman obavezno obaviti u večernjim časovima i prethodno obavestiti pčelare.

Pregledom zasada trešanja utvrdili smo da se trešnja nalazi u fenofazi od bubrenja do pucanja cvetnih pupoljaka (51-53 po BBCH skali).

Preporučujemo proizvođačima da urade tretman nekim od preparata na bazi bakra:

a.m. bakarni oksihlorid – Bakarni oksihlorid 0,5%, Bakrocid S-50 0,75% ili a.m. bakar hidroksid – Funguran OH 0,5%, Blauvit 1%

**U Somboru
21.03.2014.**

PSS "СОМБОР" СОМБОР