



Пољопривредна стручна служба „Сомбор“ д.о.о.
телефон: +38125 5412488; +38125 5414351
факс: +38125 5422855
e-mail: agroso@open.telekom.rs
web site: www.pssombor.rs
25000 Сомбор, Стапарски пут 35

SAOPŠTENJE POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE „SOMBOR“

JABUKA:

Vizuelnim pregledom zasada jabuka na području delovanja RC Sombor utvrdili smo da se jabuka nalazi u zavisnosti od sortimenta nalazi po BBCH skali u sl fazama :

-57-59 (faza cvetnih pupoljaka; većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima koje formiraju cvetnu ložu) sorta zlatni delišes

- 59-61 (većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima-početak cvetanja ;10% cvetova otvoreno) sorta Ajdared Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća sa punkta Riđica utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija gljive *Venturia inaequalis* (prouz . čađave krastavosti jabuke) kod sorte Ajdared 36,3 % dok je kod sorte Zlatni delišes 32,1 %.

U narednom periodu u najavi su padavine te stoga preporučujemo proizvođačima da pre padavina urade tretman nekim od kontaktnih ,preventivnih fungicida. Za tretman se mogu primeniti neki od navedenih fungicida

Polyram DF (a.m.metiram) - 0,2 % ili Dithane M 45 (a.m. mankozeb) - 0,25 % ili Merpan ili Kaptan (a.m. kaptan) - 0,2 do 0,3 % ili Delan 700 WG (a.m. ditianon) - 0,07 kg/ha.

BRESKVA:

Pregledom zasada breskve na području delovanja RC Sombor (punktovi Apatin i Riđica) utvrdili smo da se breskva ,u zavisnosti od sortimenta ,nalazi u fenofazama od punog cvetanja- najmanje 50 % cvetova otvoreno,prve latice otpadaju do cvetovi se smežuravaju- većina latica opada(BBCH 65-67) .

Potrebno je uraditi tretman protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (*Monillia laxa*) sa nekim od sledećih preparata:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,5 -0,75 kg /ha ,**Octave** (a.m. prohloraz) 0,04 %,**Chorus 50 WG** ,**Ciprodex** (a.m. ciprodinil) 0,03 -0,05 %

ŠLJIVA VIŠNJA:

Na području delovanja RC Sombor višnja (sorta Oblačinska) I šljiva (sort a Stenlej) se nalaze u fenofazi punog cvetanja (po BBCH skali faza 65) dok se sorte šljive Čačanska lepotica, Č.rodna,Požegača nalaze u fenofazi precvetavanja (po BBCH skali faza 67).

U narednom periodu imamo najavu padavina za područje RC Sombor te stoga preporučujemo se uradi tretman (ukoliko je od prethodnog prošlo više od 7-10 dana) namenjen zaštiti ovih voćnih vrsta od prouzrokovača monilioznog sušenja cvetova i grančica (*Monilia laxa*)

Za tretman se mogu koristiti fungicidi:

Octave (a.m. prohloraz) 0,04%, Chorus 5-WG (a.m. ciprodinil, 0,3-0,5 kg/ha), Ciprodex (a.m. ciprodinil, 0,05 %), Sekvenca (a.m. difenokonazol, 0,2 l/ha), Akord, Folicur 25 – EW (a.m. tebukonazol, 0,75 l/ha),

U Somboru

04.04.2014.

PSS”Sombor”